

## Ihr Gesundheitsamt informiert

# Scharlach

**Erreger** **Bakterien der Gruppe Streptokokken**  
( $\beta$ -hämolisierende Streptokokken der Gruppe A)

**Übertragungswege**

- Tröpfcheninfektion
- Selten auch indirekte Übertragung über Hände oder Gegenstände, die mit Nasen-Rachen-Sekret verunreinigt sind.

### Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung

1 - 3 Tage, selten länger

### Dauer der Ansteckungsfähigkeit

- 10 – 21 Tage nach Erkrankungsbeginn
- Personen mit einer akuten Streptokokkeninfektion, die nicht spezifisch behandelt wurden, können bis zu 3 Wochen kontagiös sein; solche mit eitrigen Ausscheidungen auch länger.
- Nach Beginn einer wirksamen antibiotischen Therapie erlischt die Ansteckungsfähigkeit nach 24 Stunden.

### Krankheitsbild

- Plötzlicher Beginn mit Halsschmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Unwohlsein, Bauchschmerzen und Erbrechen.
- Rötung und Schwellung der Mandeln, des weichen Gaumens und des Rachens.
- Gelegentlich grau-weißer Belag im Rachenraum, Wangenröte mit freiem Munddreieck, rote Zunge (Himbeerzunge), Hautausschlag.
- Mehrfacherkrankungen sind möglich, da es mehrere Erregertypen gibt.

### Komplikationen

- Mittelohrentzündung und Nasennebenhöhlenentzündung
- akutes rheumatisches Fieber
- Nierenerkrankungen

### Gesetzliche Bestimmungen

Meldepflicht nach § 34 Abs.6 IfSG besteht für die Leitung von Gemeinschaftseinrichtungen.

Wiederzulassung 24 Stunden nach Beginn einer wirksamen Antibiotikatherapie und dem Abklingen der Symptome möglich, bei fortbestehenden Symptomen unter der Therapie erst nach deren Abklingen.

Ohne antibiotische Therapie ist eine Wiederzulassung frühestens 24 Stunden nach dem Abklingen der spezifischen Symptome angezeigt.