

Ihr Gesundheitsamt informiert

Infektiöse Mononukleose
Pfeiffersches Drüsenfieber

Erreger	Epstein-Barr-Virus (EBV) Virus aus der Gruppe der Herpesviren.
Übertragungswege	<ul style="list-style-type: none">• Direkter Kontakt über Speichel (kissing disease - Kusskrankheit)• Tröpfcheninfektion über Nasen-Rachenraum• Ansteckung ist in seltenen Fällen auch über Gesunde, die mit dem Virus infiziert und selbst nicht erkrankt sind möglich
Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung	10 – 50 Tage.
Krankheitsbild	<p>Charakteristisch sind Fieberschübe, Lymphknotenschwellung am Hals und anderen Körperregionen, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Muskelschmerzen, Leber- und Milzvergrößerung.</p> <p>Am häufigsten erkranken Jugendliche im Alter von 15 – 19 Jahren. Im Kleinkindesalter meist schwacher oder symptomloser Verlauf. Im Erwachsenenalter oft schweres Krankheitsgefühl mit komplizierten Verläufen.</p> <p>Die Krankheit heilt in der Regel völlig aus. Das Virus kann aber im Organismus verbleiben und wieder aktiviert werden. Der infizierte Mensch bleibt dann zwar klinisch gesund, kann aber über den Speichel andere Menschen anstecken.</p>
Gesetzliche Bestimmungen	keine